

Số: /UBND-NN  
V/v hướng dẫn phòng trừ sâu  
bệnh hại cây trồng

Lam Vỹ, ngày tháng 04 năm 2024

Kính gửi: Các ông bà trưởng xóm

Hiện nay, cây lúa Xuân đang giai đoạn kết thúc đẻ nhánh - đứng cái - làm đòng, cây chè kinh doanh đang giai đoạn phát triển - thu hái búp. Điều kiện thời tiết nắng nóng, xen kẽ có các đợt mưa giông về đêm và sáng sớm, là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát triển gây hại trên diện rộng.

Theo dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, trong thời gian tới, đặc biệt dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, thời tiết chuyển nắng nóng gay gắt, xen kẽ mưa, ẩm độ cao là điều kiện rất thuận lợi cho các đối tượng dịch hại cây trồng tiếp tục phát sinh gây ra. Để hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây ra, ảnh hưởng đến năng suất cây trồng; UBND xã hướng dẫn biện pháp kỹ thuật phòng trừ như sau:

### **1. Trên cây lúa**

#### **1.1. Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng hại lúa**

Tăng cường kiểm tra đồng ruộng phát hiện ổ rầy, phun thuốc trừ rầy với những ruộng lúa có mật độ từ 40-50 con/khóm trở lên (từ 1.500 con/m<sup>2</sup> trở lên).

- Đối với những diện tích lúa đang làm đòng - trổ, ruộng chủ động nước nên sử dụng các loại thuốc có tác dụng lưu dẫn như: Actara 25WG, ChetDuc 700WG, Mopride 20WP, Calira 555WP...

- Đối với những ruộng khô hạn và lúa từ giai đoạn chắc xanh đến chín, sử dụng các loại thuốc có tác dụng tiếp xúc như: Bassa 50EC, Bisector 500EC, Sieuray 250WP, Vibasa 50EC... (Yêu cầu phải rẽ lúa thành luống, mỗi luống rộng từ 0,5 - 0,6m và phun trực tiếp vào gốc lúa nơi rầy tập trung gây hại).

#### **1.2. Đối với sâu cuốn lá**

Theo dõi chặt chẽ diễn biến, xác định thời điểm sâu non nở, đặc biệt chú ý trên trà lúa Xuân giai đoạn đứng cái - làm đòng phun thuốc trừ sâu nếu thấy mật độ sâu non từ 20 con/m<sup>2</sup> trở lên (với lúa đang ở giai đoạn đứng cái - làm đòng), những ruộng có mật độ sâu cao trên 50 con/m<sup>2</sup> phải phun kép 2 lần cách nhau từ 4 - 5 ngày.

Sử dụng một trong các thuốc trừ sâu cuốn lá hại lúa được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam như: Samxacarb 145SC, Boema 50WG, Emacao 75WG, Patox 95SP...

#### **1.3. Đối với sâu đục thân**

- Theo dõi diễn biến của trưởng thành, mật độ ổ trứng và thời điểm sâu non nở đặc biệt trên những ruộng đang trong giai đoạn đứng cái - làm đòng - trổ bông.

- Sử dụng thuốc phun trừ sâu đục thân cho những ruộng lúa có mật độ ổ trứng trên  $0,3 \text{ ổ/m}^2$  ( $3 \text{ ổ/10m}^2$ ), thời điểm phun khi sâu non mới nở, những ruộng có mật độ ổ trứng cao trên  $1 \text{ ổ/m}^2$  ( $10 \text{ ổ/10 m}^2$ ) cần tiến hành phun kép 2 lần cách nhau từ 4 - 5 ngày.

- Sử dụng một trong các thuốc trừ sâu đục thân hại lúa được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam như: Rep Play 75WP, Patox 95SP, Bisector 500EC, Boxing 99.99EW, Neretox 18 SL, 95WP...

#### **1.4. Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông**

\* Đối với bệnh đạo ôn lá

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, nhất là lúc có điều kiện thời tiết thích hợp và nơi có điều kiện canh tác thuận lợi cho bệnh phát triển.

Với những ruộng bệnh đã xuất hiện, thực hiện dùng bón phân đạm, không phun các chất kích thích sinh trưởng và phân bón lá, giữ đủ nước trong ruộng, tranh thủ thời tiết thuận lợi để phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu khi bệnh mới xuất hiện. Những ruộng bệnh gây hại nặng phải phun kép 2 lần cách nhau từ 5 - 7 ngày. Sử dụng các loại thuốc đặc hiệu có trong danh mục thuốc BVTV được phép lưu hành tại Việt Nam để phun trừ như: Daconil 75WP, Fuji-One 40EC, Fuan 40EC, Tokyo Nhật 220WP...

\* Đối với đạo ôn cổ bông, cổ gié

Tiến hành phun thuốc phòng bệnh với những ruộng lúa đã bị nhiễm đạo ôn lá và những ruộng xung quanh, đặc biệt những ruộng cấy giống nhiễm như: BC15, Nếp, J02, TBR225... Sử dụng một trong các thuốc trừ bệnh đạo ôn hại lúa được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam như: Daconil 75WP; Fuji-One 40EC, Camel 860WP; Tokyo Nhật 220WP...

Thời điểm phun khi lúa trổ được 10% số bông trên ruộng hoặc sau khi lúa trổ thoát (Phun vào thời điểm hạt chấu khép). Đối với những ruộng bị bệnh đạo ôn lá hại nặng cần tiến hành phun kép 2 lần, lần 1: Trước khi lúa trổ 1-2 ngày, lần 2: Sau khi lúa trổ thoát. Sau khi phun thuốc nếu gặp mưa to cần phải phun lại.

#### **1.5. Bệnh khô vằn:**

Áp dụng tổng hợp các biện pháp chăm sóc cây khỏe, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện ổ bệnh, phun thuốc trừ bệnh bằng một trong các loại thuốc trừ bệnh khô vằn hại lúa được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam như: Tilt Super 300EC, Anvil 5SC, Vida 5WP, Mekong Vil 5SC... Sau khi phun thuốc 5-7 ngày, kiểm tra lại, nếu bệnh chưa dừng phải phun lại.

#### **1.6. Bệnh do vi khuẩn (Bạc lá lúa, đốm sọc vi khuẩn)**

Thường xuyên thăm đồng, theo dõi, phát hiện bệnh sớm, khi phát hiện thấy ruộng chớm bị bệnh cần giữ mực nước từ 3 - 5 cm, tuyệt đối không được bón các loại phân hóa học, phân bón qua lá và thuốc kích thích sinh trưởng.

Dùng các loại thuốc trừ bệnh được phép sử dụng tại Việt Nam như: Asusu 20WP, Supermil 40SL, Tokyo Nhật 220WP... để phun trừ bệnh. Sau khi phun thuốc từ 5-7 ngày, kiểm tra lại, nếu bệnh chưa dừng, phải phun tiếp lần 2.

## 2. Trên cây chè

Hướng dẫn quản lý bọ cánh tơ và rầy xanh hại chè bằng các biện pháp sau:

- Thực hiện các biện pháp chăm sóc, bón phân cân đối hợp lý, dọn sạch cỏ dại, kết hợp tưới nước, tủ gốc giữ ẩm cho chè... đảm bảo cây chè sinh trưởng phát triển tốt.

- Áp dụng kỹ thuật “Hái chạy” nếu đến lứa hái.

- Thường xuyên kiểm tra diễn biến rầy xanh, bọ cánh tơ trên các nương chè, xác định thời điểm rầy, bọ cánh tơ nở đặc biệt chú ý giai đoạn chè nảy búp đến trước thu hái 7 ngày, nếu thấy tỷ lệ búp bị hại từ 10% (theo dõi 100 búp có 10 búp bị hại) trở lên thì sử dụng thuốc phun trừ bằng một trong các loại thuốc được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam ví dụ như: Trebon 10EC, Kuraba 3.6EC, Shertin 5.0EC, Tridan 21.8WP... phun thuốc khi rầy, bọ cánh tơ còn non.

*Chú ý: Đảm bảo tuân thủ thời gian cách ly, nồng độ, liều lượng theo hướng dẫn trên bao bì. Với lứa đang trổ, chỉ được phun vào buổi chiều mát. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng cần tưới ẩm cho chè trước khi phun thuốc, tránh ngộ độc thuốc.*

UBND xã chỉ đạo cán bộ nông nghiệp xã, cán bộ khuyến nông phối hợp với xóm tăng cường kiểm tra đồng ruộng, để phát hiện kịp thời sự phát sinh, phát triển của sâu bệnh gây hại trên cây trồng. Triển khai hướng dẫn các biện pháp phòng trừ theo hướng dẫn trên để hạn chế thấp nhất những thiệt hại do sâu bệnh gây hại, không để ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Hoàng Văn Phòng**