

Số: /UBND-NN  
V/v tăng cường phòng trừ rầy  
nâu, rầy lưng trắng hại lúa vụ  
Xuân năm 2024

Lam Vỹ, ngày tháng 05 năm 2024

Kính gửi: - Các ban ngành liên quan;  
- Các ông bà trưởng xóm.

Hiện nay qua kiểm tra đồng ruộng lúa Xuân đang giai đoạn ôm đòng - trở bông, mật độ rầy trung bình 450-600 con/m<sup>2</sup>, nơi cao 1200 - 1500 con/m<sup>2</sup> tuổi non - trưởng thành. Thời tiết nắng nóng, xen kẽ có mưa rào, ẩm độ cao điều kiện thuận lợi cho rầy phát sinh, phát triển và gây hại. Nếu không phòng trừ kịp thời sẽ gây vàng lá, cháy chòm cục bộ làm ảnh hưởng đến năng suất lúa.

Để hạn chế thiệt hại do rầy nâu, rầy lưng trắng gây ra, UBND xã đề nghị các ban ngành liên quan, các xóm quan tâm chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo cán bộ nông nghiệp phối hợp với cán bộ Trung tâm phụ trách công tác khuyến nông tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch hại, chủ động tham mưu các biện pháp phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại trên cây lúa, ngoài ra đặc biệt chú ý các đối tượng: bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, bệnh khô vằn, đạo ôn cổ bông, sâu đục thân... trên trà lúa Xuân.

2. Hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng cụ thể như sau:

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng phát hiện sớm kịp thời đối tượng rầy.
- Vệ sinh đồng ruộng, dọn tàn dư cây cỏ và rác.

- Lúa giai đoạn ôm đòng - trở bông: Giữ nước thường xuyên trên ruộng. Đối với những ruộng có mật độ cao từ 40 con/khóm trở lên, những ruộng chủ động nước nên sử dụng các loại thuốc có tính nội hấp, lưu dẫn như: Actara 25WG, Chessin 600WP, ChetDuc 700WG, Mopride 20WP, Calira 555WP... Sau phun 3-5 ngày kiểm tra lại, nếu rầy tiếp tục nở, mật độ còn cao cần phun lại lần 2, dùng luân phiên các loại thuốc để tránh rầy kháng thuốc.

- Đối với diện tích lúa từ giai đoạn trở đi, những ruộng khô hạn sử dụng các loại thuốc có tác dụng tiếp xúc, xông hơi như: Daran - HB 250WP, Bassa 50EC, Bisector 500EC, Sieuray 250WP, Vibasa 50EC... (Yêu cầu phải rẽ lúa thành luống, mỗi luống rộng từ 0,5 - 0,6m và phun trực tiếp vào gốc lúa nơi rầy tập trung gây hại).

\* Một số chú ý khi phun trừ rầy:

- Rầy nâu là loại côn trùng có tính chống thuốc cao, nên sử dụng khi rầy tuổi nhỏ (rầy cám tuổi 1-2). Khi sử dụng nhiều lần một loại thuốc hoặc mật độ rầy cao, tỷ lệ rầy trưởng thành lớn cần phối hợp 2 loại nhóm thuốc khác nhau trừ rầy mới có hiệu quả.

- Khi phát hiện rầy trên đồng ruộng thì phải phun thuốc đặc trị rầy. Khi phun thuốc phải tuân thủ theo nguyên tắc “4 đúng”: Đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng lúc và đúng cách. Khi lúa trổ phải phun thuốc vào buổi chiều mát. Những ruộng mật độ rầy cao, thường hay gây hại nặng cần giữ nước trong ruộng đến lúc gần thu hoạch hoặc mật độ rầy đã giảm mới tháo cạn nước để chuẩn bị thu hoạch.

Ngoài ra cần lưu ý hiện tượng lúa bị vàng lá, đặc biệt trên trà lúa Xuân muộn giai đoạn đứng cái - làm đòng, ruộng bón thiếu dinh dưỡng, ruộng khô hạn thiếu nước. Nguyên nhân do điều kiện thời tiết thay đổi bất thường từ nhiệt độ cao, đột ngột nhiệt độ giảm thấp, dễ thích nghi với điều kiện thời tiết bất thường cây lúa sẽ bị vàng lá. Đối với hiện tượng vàng lá do yếu tố thời tiết gây ra, không phun thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ bệnh vàng lá lúa. Áp dụng các biện pháp chăm sóc cho cây lúa phục hồi như: những ruộng thiếu dinh dưỡng cần bổ sung phân cho cây (bón thêm phân chuồng hoai mục, phân kaly, phun phân bón qua lá...) và bổ sung thêm nước trên chân ruộng cạn.

UBND xã đề nghị các ban ngành liên quan, các xóm triển khai thực hiện để nông dân chủ động kiểm tra đồng ruộng và thực hiện các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh theo hướng dẫn kịp thời, hiệu quả./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Hoàng Văn Phòng**